

# Supozitoare cu glicerină pentru copii

glicerol, 1405 mg

Antibiotice **at**

## Compoziție

Un supozitor conține glicerol (1405 mg), stearat de sodiu și apă purificată.

## Mod de acțiune

Supozitoarele cu glicerină pentru copii sunt folosite pentru ușurarea defecației. În acest scop pot fi utilizate după intervenții chirurgicale sau înaintea rectoscopiei. Supozitoarele cu glicerină stimulează secreția la nivelul mucoasei rectale și simultan declanșează mecanismul defecației.

## Contraindicații / Precauții

Nu utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii

- la copii alergici la glicerol sau la oricare dintre componentele acestui produs.

Utilizați cu precauție Supozitoare cu glicerină pentru copii

- la copii sub 2 ani, deoarece poate împiedica funcționarea normală a reflexului de defecație.

- la copii cu diverse afecțiuni la nivelul intestinului gros sau a rectului (crize hemoroidale, fisuri anale, rectocolite hemoragice).

Supozitoarele cu glicerină pentru copii sunt doar un adjuvant al tratamentului igienico-dietetic. Pentru normalizarea scaunelor, suplimentați alimentația cu fibre și lichide și efectuați activități fizice.

Nu utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii timp îndelungat. Utilizarea de Supozitoare cu glicerină pentru copii în cazul constipației nu trebuie să depășească 10 zile.

Dacă în acest interval simptomele nu se îmbunătățesc sau se înrăutățesc, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Pentru a ușura administrarea, introduceți în prealabil supozitoarele în apă rece.

## Reacții adverse

Reacțiile adverse apar foarte rar și sunt mai ales reacții locale, datorate utilizării supozitoarelor timp îndelungat: senzații de arsură anală, iar excepțional rectite congestive (inflamații la nivelul rectului).

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice altă reacție adversă, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## Dozare și mod de administrare

Supozitoarele cu glicerină pentru copii se administrează intrarectal. Uzual, se utilizează un supozitor la nevoie.

În pregătirea examenului endoscopic al rectului:

- un supozitor cu 5-30 de minute înainte de ora aleasă pentru intervenție.

Supozitoarele se administrează intrarectal, după îndepărtarea ambalajului, introducând mai întâi partea ascuțită a supozitorului.

## Păstrare

Nu utilizați Supozitoare cu glicerină pentru copii după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Ase păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Anu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

## Producătorul

Antibiotice S.A.,

Str. Valea Lupului, nr. 1, 707410, Iași, România



BT 9452P

26.09.2013

*[Signature]*