



Zolpidem Atb 10 mg comprimate filmate
tartat de zolpidem

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conine informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Zolpidem Atb și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zolpidem Atb
3. Cum să utilizați Zolpidem Atb
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zolpidem Atb
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE ZOLPIDEM ATB ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zolpidem Atb face parte din clasa de medicamente cunoscută sub denumirea de psiholeptice; hipnotice și sedative; produse înrudite cu benzodiazepine. Zolpidemul este indicat în tratamentul de scurtă durată al insomniei.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI ZOLPIDEM ATB

Nu utilizați Zolpidem Atb

- dacă sunteți alergic la zolpidem sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament;
- dacă suferiți de boli respiratorii sau hepatice grave;
- dacă suferiți de o afecțiune care se manifestă prin oprirea respirației în timpul somnului;
- dacă ați fost diagnosticat cu miastenia gravis.

Nu administrați acest medicament copiilor sau persoanelor cu afecțiuni psihotice.

Atenționări și precauții

Cauza insomniei trebuie identificată de câte ori este posibil și tratamentul cu zolpidem trebuie să fie de durată cât mai scurtă, la dozele minime eficace. Medicul nu vă va recomanda zolpidem mai mult de 7-14 zile. Dacă insomnia nu dispără în acest interval de timp, adresați-vă din nou medicului dumneavoastră pentru o evaluare mai amănunțită. Dacă utilizați zolpidem mai mult timp, poate să apară dependență fizică și psihică. Este important să luați acest medicament doar la recomandarea medicului. Factorii care favorizează apariția dependenței sunt: durata tratamentului, doza, antecedente ale altor dependențe medicamentoase, alcoolice, toxicomanii. Farmacodependența poate apărea la doze terapeutice și/sau la pacienți fără factori de risc individualizați. Acești pacienți trebuie supravegheati cu atenție. La întreruperea bruscă a tratamentului poate să apară un fenomen de sevraj, manifestat printr-o simptomologie diversă. Anumite simptome sunt frecvente și aparent banale: insomnia, céfalee, anxietate importantă, mialgii, tremurături, iritabilitate. Alte simptome sunt mai rare: agitație, episoade confuzionale, parestezii ale extremităților, hiperreactivitate la lumină, depersonalizare, fenomene



halucinatorii, convulsii. Simptomele de sevraj se pot manifesta în ziua de după întreruperea tratamentului. Deoarece durata de acțiune a zolpidemului este scurtă, simptomele de sevraj se pot manifesta chiar și în intervalul de timp dintre două prize. Asocierea mai multor benzodiazepine sau substanțe înrudite, oricare ar fi indicațiile (fie anxiolitice, fie hipnotice), crește riscul de farmacodependență. Zolpidemul poate determina efect de rebound. Acest sindrom tranzitor se poate manifesta sub forma exacerbării insomniei.

În câteva ore de la administrarea zolpidem pot apărea alterări ale funcțiilor psihomotorii.

Înainte de a lua zolpidem, asigurați-vă condiții de somn pentru o durată neîntreruptă de 7-8 ore, deoarece este posibil să suferiți de amnezie anterogradă (să nu țineți minte ce ați făcut la câteva ore după administrarea medicamentului).

În cursul tratamentului cu zolpidem, la unei pacienți, mai ales la vârstnici, pot apărea reacții paradoxale, manifestate prin: agravarea insomniei, nervozitate, agitație, agresivitate, delir, coșmaruri, somnambulism, halucinații, comportament inadecvat. În aceste situații, întrerupeți administrarea de zolpidem și adresați-vă medicului.

Efectul sedativ sau hipnotic al benzodiazepinelor și al medicamentelor înrudite poate diminua progresiv în timpul utilizării unei doze constante în cazul administrării timp de mai multe săptămâni.

În timpul tratamentului cu zolpidem se pot produce tulburări de respirație, uneori chiar periculoase.

Grupe de pacienți cu risc:

Pacienți în vârstă: La persoanele în vârstă sau la cei care suferă de insuficiență renală sau hepatică, timpul de înjumătățire al zolpidemului poate crește considerabil. La acești pacienți este necesară adaptarea posologiei.

Benzodiazepinele și medicamentele înrudite se vor utiliza cu prudență la pacienții vârstnici, datorită riscului sedării și a efectului miorelaxant, care pot favoriza căderi cu consecințe uneori grave la această categorie de vârstă.

Pacienți depresivi și psihotici:

Administrarea de zolpidem poate accentua stările depresive și astfel poate crește riscul suicid. De aceea se recomandă prudență în administrarea zolpidemului la pacienții depresivi și psihotici.

Pacienții cu insuficiență respiratorie:

Hipnoticele pot altera funcția respiratorie. Utilizarea zolpidemului la pacienții cu insuficiență respiratorie severă sau acută este contraindicată.

Pacienții cu insuficiență hepatică: insuficiența hepatică severă este o contraindicație.

Zolpidem Atb împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Dacă utilizați acest medicament împreună cu altele, se poate modifica modul lor de acțiune.

Zolpidemul nu trebuie administrat concomitant cu alcool. Efectul sedativ poate fi potențiat dacă produsul este utilizat în asociere cu alcool.

Medicul va ține cont de posibila accentuare a efectelor depresive în cazul administrării concomitente a zolpidemului cu antipsihotice (neuroleptice), hipnotice, anxiolitice/sedative, antidepresive, derivați de morfină (analgezice și antitusive), antiepileptice, anestezice, antihistaminice H₁ sedative.

Zolpidemul interacționează cu sertralina. Această interacțiune determină accentuarea somnolenței. De asemenea au fost raportate cazuri izolate de halucinații vizuale.

În cazul administrării zolpidem concomitant cu narcotice analgezice pot apărea stări de euforie crescută care pot duce la dependență psihică.

Medicamentele care inhibă anumite enzime hepatice (în special citocrom P450), pot determina creșterea activității benzodiazepinelor și a substanțelor înrudite. Efectul zolpidemului este diminuat dacă acesta este administrat în asociere cu inductori ai CYP3A4, de exemplu rifampicina. Cu toate acestea, când zolpidemul a fost administrat împreună cu itraconazol (un alt inhibitor al CYP3A4), farmacocinetica și farmacodinamia lui nu au fost modificate semnificativ. Semnificația clinică a acestor rezultate nu este cunoscută.

Zolpidem Atb împreună cu alimente și băuturi

Evitați consumul de grapefruit sau de suc de grapefruit în timpul tratamentului cu zolpidem. Sucul de grapefruit poate determina creșterea concentrației medicamentului în organismul dumneavoastră.



Zolpidemul intensifică efectul alcoolului. Nu consumați băuturi alcoolice în timpul tratamentului cu acest medicament.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu luați zolpidem dacă sunteți însărcinată sau planificați să rămâneți însărcinată. Consultați medicul în prealabil. Există riscul apariției la copil a dificultăților respiratorii, precum și a sindromului de sevraj. Zolpidemul se excretă în laptele matern. Nu alăptați în timpul tratamentului cu acest medicament. Dacă acest medicament este esențial pentru sănătatea dumneavoastră, medicul vă poate recomanda întreruperea alăptării pe perioada tratamentului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Conducătorii de autovehicule și operatorii de utilaje, trebuie avertizați că, asemănător altor hipnotice, poate exista un risc de somnolență în dimineața ulterioară administrării zolpidem. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje poate fi afectată prin sedare, amnezie, scăderea capacitatii de concentrare sau slăbiciune musculară. De aceea nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje în timpul tratamentului cu zolpidem. Consultați medicul în prealabil.

Zolpidem Atb conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SA UTILIZAȚI ZOLPIDEM ATB

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Tratamentul cu Zolpidem Atb este un tratament individualizat, în funcție de răspunsul fiecărui pacient, de aceea tineți cont de recomandările medicului dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. Tratamentul trebuie să înceapă de la cea mai mică doză care determină un răspuns și pe durată cât mai scurtă. În general durata tratamentului variază de la cîteva zile la câteva săptămâni, iar durata maximă a unui tratament nu trebuie să depășească 4 săptămâni, înluzind perioada de reducere treptată a dozelor. Luați zolpidem imediat înainte de culcare.

Doza zilnică totală de zolpidem nu trebuie să depășească 10 mg.

Zolpidem nu se administrează copiilor sub 18 ani.

Respectați programările la medic, pentru a se reevalua indicația de tratament cu regularitate.

Dacă luați mai mult Zolpidem Atb decât trebuie

Administrarea oricărui medicament în exces poate avea serioase consecințe. Dacă suspectați supradozajul cu zolpidem, anunțați de urgență medicul. Simptomele supradozajului sunt: tulburări ale stării de conștiință, precum și somnolență până la comă ușoară. Dacă luați în exces zolpidem, singur sau în combinare cu alcool ori cu alte medicamente cu acțiune la nivelul sistemului nervos, acest lucru vă poate fi fatal. Se vor iniția măsuri suportive generale, precum și lavaj gastric imediat.

Nu se vor administra sedative chiar în cazul stărilor de agitație.

În funcție de severitatea simptomelor, se poate administra flumazenil, antagonist al benzodiazepinelor, asigurîndu-se măsurile necesare de resuscitare în mediu spitalicesc (ventilație, acces venos).

Dacă uități să luați Zolpidem Atb

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Este important să nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.



Dacă încetați să luați Zolpidem Atb

Nu îintrerupeți brusc tratamentul cu zolpidem. Încetați administrarea zolpidem doar conform recomandării medicului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zolpidem Atb poate determina reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Reacțiile adverse au fost clasificate astfel:

Foarte frecvente:	care afectează mai mult de 1 pacient din 10
Frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 10 pacienți
Mai puțin frecvente:	care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți
Rare:	care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți
Foarte rare:	care afectează mai puțin de 1 din 10000 pacienți
Cu frecvență necunoscută:	care nu poate fi estimată din datele disponibile

Frecvente:

-halucinații, agitație, coșmaruri, somnolență, cefalee, vertij, insomnie exacerbată, amnezie anterogradă (efectele amnezice pot fi asociate cu comportament anormal), diaree, oboseală.

Mai puțin frecvente:

-stare confuzională, iritabilitate, diplopie.

Cu frecvență necunoscută:

-edem angioneurotic, neliniște, agresivitate, iluzii, furie, comportament anormal, somnambulism, dependență, afectarea libidoului, un nivel scăzut al stării de conștiință, creșterea nivelului enzimelor hepatici, erupții cutanate tranzitorii, prurit, urticarie, oboseală musculară, tulburări de mers, toleranță la medicamente, căderi (în special la pacienții vârstnici cărora nu li s-a administrat zolpidem în concordanță cu recomandările).

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZOLPIDEM ATB

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament dacă observați semne vizibile de deteriorare

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONTINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Zolpidem Atb

-Fiecare comprimat filmat conține tartrat de zolpidem 10 mg.

- Celealte componente sunt: *nucleu* - lactoză monohidrat 93% cu povidonă 3,5% și crospovidonă 3,5%, celuloză microcristalină, amidonglicolat de sodiu, stearat de magneziu, *film* - alcool polivinilic parțial hidrolizat, macrogol/PEG 3350, dioxid de titan (E171), talc, indigo Carmine FD&Blue 2 lac de aluminiu (E132), oxid galben de fier (E172), oxid negru de fier (E172)

Cum arată Zolpidem Atb și conținutul ambalajului

Comprimate filmate de culoare gri deschis, rotunde, biconvexe, cu o linie de rupere pe una din fețe.

Comprimatul poate fi divizat în două părți egale



Ambalaj:
Cutie cu 1 blister din PVC/Al a 10 comprimate filmate.

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul
ANTIBIOTICE S. A.**
Str. Valea Lupului nr. 1, Iași, 707410 Iași, România

Pentru orice informații referitoare la acest medicament vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

România

ANTIBIOTICE S.A.

Str. Valea Lupului nr. 1, Iași, 707410 Iași,

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2013